

Методом совместного(совмещённого) дубления при выделке шкур пользуются многие мастера при выделке,очевидно он имеет как свои преимущества,так и свои недостатки,но то что он существенно облегчает работу-несомненно.

При добавлении соды в раствор во время **выделки шкур** следует её добавлять постепенно,не всю сразу,так как будет происходить реакция взаимодействия соды с кислотой,в результате которой выделяется углекислый газ,объём раствора при этом увеличивается и возможно его вытекание через верх емкости.

1.Отмачивание.

Вода 26-28 град.,соль 20гл,кислота 7 гл.Время отмачивания 12-24 часа.

2.Мездрение.

3.Стирка.

0.5-1 гл моющего средства или стиральный порошок,вода 26-28 град.,отжать,можно не полоскать.

4.Пикеливание-Дубление.

Пикеливание шкур кролика.Вода 26-28 град.,соль 40-50 гл,кислота уксусная 15 гл.Время 12-24 часа.

Дубление шкур.В пикельный раствор добавляем предварительно разбавленный в горячей воде хромовый дубитель (желательно низкой основности) из расчёта 4-8 гл.Помешиваем,приблизительно через 1 час начинаем вводить в раствор соду кальцинированную до достижения необходимого уровня РН раствора.

Время дубления 12-24 часа.

5.Отжим.Жировка,отделочные операции.